



MUSA STUDIO DONOSTIA

musadonostia.com

INFORMACIÓN ANEXA AL USUARIO

La práctica del piercing es un procedimiento estético que tiene como finalidad el embellecimiento de diferentes partes del cuerpo el cuál implica perforar el tejido. El conocimiento de los riesgos y la aceptación previa a la práctica a realizar puede evitar sufrimientos innecesarios para el usuario.

CONTRAINDICACIONES:

No se podrá realizar bajo ninguna circunstancia:

- En caso de ser alérgico a los materiales.
- Cuando en la zona a perforar hay afecciones de la piel como pecas, manchas, verrugas o lesiones cutáneas no diagnosticadas.
- Si se padecen enfermedades de la piel como Psoriasis, Urticaria, Dermatitis, etc.

Será necesario un informe médico en caso de:

- Padecer infecciones o enfermedades como la diabetes, afectaciones cardíacas o renales, hepatitis, VIH, etc., ya que disminuyen las defensas y las complicaciones pueden ser más graves.
- Padecer enfermedades de la sangre o si se está haciendo un tratamiento anticoagulante con Acenocumarol (Sintrom) ya que se podría provocar hemorragia.
- Si recientemente se ha tratado acné con Isotretinoína (Isoacne, Dercutane, Acnemin, etc.) ya que modifican las mucosas de la piel y se podría sangrar con más facilidad.
- Si se padece epilepsia ya que podría desencadenar un ataque.
- Si se padecen trastornos psicológicos o de la personalidad.

De forma temporal:

- En caso de padecer alguna afección aguda como infecciones locales por verrugas víricas, herpes simple o infecciones bacterianas, flemones, conjuntivitis, etc. Según la zona donde se quiera realizar el piercing es mejor esperar a que el proceso patológico se resuelva.
- Si ha tenido muy recientemente intervenciones quirúrgicas, quimioterapia o radioterapia, o tiene cicatrices no estabilizadas, quemadas recientes, úlceras o hematomas. En este caso es mejor esperar a que la debilidad inmunológica se estabilice.

Embarazo o lactancia:

Son circunstancias en las que es difícil el tratamiento de las posibles complicaciones por el peligro de transmisión de agentes que puedan causar efectos no deseables para el bebé.

RIESGOS SANITARIOS

- Enfermedades de transmisión sanguínea como Hepatitis, Tétanos o Sida. Pueden ser contagiadas a través del instrumental con el que se realiza el piercing si no se tiene una buena práctica higiénica y no se cumple con la normativa establecida (material esterilizado y/o de un solo uso).
- Infecciones locales bacterianas, víricas o fungicidas si se realizan prácticas poco asépticas o no se hacen bien las curas durante el proceso de cicatrización.
- Alergias al látex de los guantes del aplicador.
- Reactivación de herpes simple o zóster.
- Mala cicatrización, cicatrices hipertrofiadas, o queloides.

INFORMACIONES PREVIAS A LA PRÁCTICA

- Pueden producirse otros efectos leves como inflamación, dolor o micro hematomas en la zona de la perforación.
- Puede haber migración de la pieza de joyería, sobre todo si se duerme sobre dicha perforación.
- En caso de pruebas diagnósticas como resonancias magnéticas tendrá que hacerlo constar y retirar las piezas.
- Si es donante de sangre, la aplicación de un piercing limitará la posibilidad de hacerlo (a consultar). Igualmente tendrá que hacerlo constar.
- Los días antes de perforarse es recomendable no consumir drogas ni alcohol, o medicamentos antiplaquetarios como Aspirina.
- No exponerse al sol ni a los rayos uva, ni realizar tratamientos faciales.
- Es preferible no estar en ayunas.